

Напомена

Позитиван тест на туберкулозу обично остаје позитиван годинама, чак и након узимања ИНХ. Ако вам је неопходан доказ туберкулинског статуса, покажите ову евиденцију.

Туберкулински кожни тест (ППД)

Име и презиме: _____

Датум тестирања: _____

Датум/време заказано за читавање резултата:

Датум читања: _____

Резултат (mm): _____

Ако је резултат позитиван, датум/време
заказано за рендгенски снимак плућа:

Срески департамент здравља

The Florida Department of Health
Bureau of TB and Refugee Health

Туберкулински КОЖНИ ТЕСТ

показује:
ко је инфициран?
шта то значи?

Туберкулоза



Шта је туберкулоза?

Туберкулоза (ТБЦ) је оболење које се путем ваздуха преноси са особе на особу. Некада давно ТБЦ је била позната као „сушица”. ТБЦ бацили долазе у ваздух када заражена особа кашље, кише, смеје се или пева. ТБЦ обично погађа плућа али може погодити и друге делове тела као што су мозак, бубрези или кичма. Неки људи инфицирани ТБЦ бацилима ће да оболе од туберкулозе.

Знаци туберкулозе

Уобичајени знаци су хроничан кашаљ, сувалост, ноћно презнојавање, необјашњиво губљење на тежини, повишена температура, губитак апетита или искашљавање крви. Врло често је једини знак упоран кашаљ. Како су ови знаци често и симптомима других оболења, обавезно посетите лекара.

Кожни тест

Сврха туберкулинског кожног теста је да покаже да ли сте заражени бацилима (бактеријом) који изазивају (ТБЦ) туберкулозу.

Како се обавља?

Мала количина безопасног туберкулинског протеина се убризгава у површински слој коже, обично на подлактици.

Шта показује?

Место убризгавања се испитује 48 до 72 сата након убризгавања. Ако је тест НЕГАТИВАН или безначајан, то обично значи да нисте заражени бацилима туберкулозе. Међутим, код неких оболења која утичу на имунитет организма резултати теста могу бити



погрешно негативни. Пре но што направите кожни тест поразговарајте о овоме са особом која вам обавља тестирање.

Ако је тест ПОЗИТИВАН или значајан (на месту убризгавања се појавио оток, црвенило и/или плик), значи да сте заражени туберкулозом и да у

телу носите бациле који могу да доведу до туберкулозе. Не мора да значи да имате туберкулозу или да можете да је пренесете на друге људе. Да се види да ли сте оболели од туберкулозе потребно је да се направи рендгенски снимак плућа и можда неки други тестови. Понекад тест може да буде прочитан као „неизвестан”. У том случају је вероватно потребно да се тест понови. Особа која обавља тестирање ће да вам објасни зашто је то потребно.

Ко треба да се тестира?

Особе с високим ризиком од излагања туберкулози треба да се тестирају у редовним интервалима. Особе које су дошле у додир са неким ко има активну туберкулозу треба да ураде тест што је пре могуће. Такође треба да се тестира свака особа која је заражена ХИВ вирусом.

Како се шири?

Бациле туберкулозе удишете у плућа када дишете исти ваздух као и неко са активном туберкулозом. То је обично код куће, тамо где радите или где проводите већину свог слободног времена. Бациле туберкулозе нећете добити од кратког или случајног контакта на отвореном ваздуху. Веома често извор инфекције остаје непознат и можете и незнајући да будете заражени годинама пре.

Шта могу да урадим?

Ако сте заражени, туберкулозу можете да добијете било када током живота. Ако вам је рендгенски снимак плућа нормалан и немате симптома, третман лековима може да се препише како би се спречило оболевање од туберкулозе сада или после у животу. Најчешће кориштен лек се зове изониазид (ИНХ) и мора да се узима сваки дан 6 до 9 месеци, зависно од упута лекара.

Ко треба да узима ИНХ?

Веома је важно да особе инфициране ТБЦ бацилом и које су у високоризичној групи да добију туберкулозу размисле о третману. Ваш лекар ће да вам објасни који су ваши ризици да оболите.

Инфициране особе које су дуже време имале блиски контакт са неким ко болује од туберкулозе спадају у високоризичну групу. Примери инфицираних особа из високоризичне групе да добију туберкулозу су особе са ХИВ инфекцијом, особе којима се на снимку плућа види „стара туберкулоза” или особе које болују од оболења као што је дијабетес.

Превенција је важна

Превенција туберкулозе је важна за ваше здравље као и за здравље особа које су вам блиске.

Ако вам лечење није препоручено или ако не довршите лечење, требате имати на уму знаке и симптоме туберкулозе. Ако приметите код себе неке знаке или симптоме оболења, тражите одмах помоћ лекара.

