

VIA/SIDA entre HISPANOS

E.U. hasta 2008*

CDC estima un total de 663,084 personas viviendo con un diagnóstico de infección de VIH
Los HISPANOS representan el:

17% of total
18% de los hombres adultos y 16% de las mujeres adultas
19% de los casos pediátricos
16% de hombres que tienen sexo con hombres (MSM por sus siglas en inglés)
23% de usuarios de drogas inyectables (IDU por sus siglas en inglés)
16% de los casos de transmisión heterosexual

15% de los casos de muerte por SIDA en el 2008

Según el Bureau del Censo de los Estados Unidos del 2000, sólo el 11% de la población en Estados Unidos eran Hispanos

Florida 2010

Florida ha reportado un total de 95,335 personas viviendo con un diagnóstico de infección de VIH
Los HISPANOS representan el:

20% of total
22% de los hombres adultos y 13% de las mujeres adultas
12% de los casos pediátricos
25% de hombres que tienen sexo con hombres (MSM por sus siglas en inglés)
18% de usuarios de drogas inyectables (IDU por sus siglas en inglés)
14% de los casos de transmisión heterosexual

15% de los casos de muerte por SIDA en el 2010

Según el estimado de población en la Florida del 2010, el 21% de la población eran Hispanos

*La data de Estados Unidos representa 40 estados con reportes de infección de VIH confidenciales Fuente de la data de Estados Unidos: CDC Reporte de Vigilancia de VIH 2009

El índice de casos estimados entre los hispanos diagnosticados con SIDA en los Estados Unidos en 2009 fue de 13.9 por 100,000 habitantes lo cual fue mas bajo que en la Florida en el mismo año (20.4).

El perfil de comportamiento de riesgo entre los hispanos viviendo con VIH/SIDA en los Estados Unidos es diferente entre los hispanos de la Florida.

	Hombres		Mujeres	
	E.U. hasta 2008	FL hasta 2010	E.U. hasta 2008	FL hasta 2010
MSM	59%	72%	-----	-----
IDU	24%	9%	29%	13%
MSM/IDU	6%	4%	-----	-----
Heterosexual	11%	14%	71%	84%
Other/NIR	<1%	1%	1%	3%

Tanto la data Nacional como la de Florida el tiempo de sobrevivencia de un diagnóstico de SIDA a su muerte es significativamente corto en los hispanos, en comparación con la raza blanca. De los casos de SIDA que fallecieron en la Florida desde el 2001-2010, la raza blanca tiene una media de supervivencia de 65 meses en comparación con la raza negra, quien tuvo 46 meses y los hispanos quienes tuvieron 49 meses.

Recomendaciones:

- Incrementar entre los hispanos el conocimiento sobre el VIH/SIDA;
 - Alentar a las personas hispanas a hacerse la prueba del VIH;
 - Involucrar a los jóvenes en los programas de planificación, decisiones y prevención del VIH;
 - Disminuir las barreras para hacerse la prueba, prevención y cuidado del VIH, eliminando el estigma existente en la comunidad sobre el VIH/SIDA;
 - Diseminar información sobre los beneficios para la salud en el uso del condón y otras medidas de prevención.
- Para datos en la Florida, visite http://www.doh.state.fl.us/disease_ctrl/aids/trends/trends.html .
Para datos nacionales visitar: <http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/index.htm> or <http://www.kff.org/hiv/aids/>

En el 2010, la proporción de nuevos casos de VIH reportados entre adultos hispanos (edad 13+) aumentaron de un 17% en el 2001 a un 22% en el 2010.

En la Florida, en el 2010, los casos de VIH entre hombres adultos hispanos fue dos veces más alto que en hombres de la raza blanca y 4 veces más altos para mujeres hispanas adultas que la misma cantidad entre mujeres de la raza blanca.

Entre adultos (edad 13+) uno en 111 hombres hispanos y una en 439 mujeres hispanas están infectados con VIH, comparado con uno en 201 hombres de la raza blanca y una en 1,1121 mujeres de la raza blanca.

Entre los hispanos viviendo con el VIH/SIDA hasta el 2010, 30% han nacido en los EE.UU., 15% nacidos en Cuba, 10% nacidos en Puerto Rico, 5% nacidos en México, 26% nacidos en otros lugares y el restante 14% se desconoce el país de nacimiento.

En 2010, VIH fue la sexta causa de muerte en la Florida para hombres hispanos entre las edades de 25-44, y la quinta causa de muerte entre mujeres hispanas entre las edades de 25-44.