

Hoja informativa sobre el chancroide

Causado por el *Haemofilis dukreyi*

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los síntomas comienzan entre 3 y 10 días después de la exposición.

Chancro común (úlceras):

- Bordes rugosos o desaparejos
- Base sucia o llena de pus
- Dolor desde moderado a agudo
- Suave al tacto

Los síntomas en las mujeres incluyen:

- El chancro con frecuencia pasa desapercibido
- Dolor al orinar
- Dolor al defecar
- Sangrado rectal
- Relaciones sexuales dolorosas
- Excreciones vaginales

Los síntomas en los hombres incluyen:

- Chancro, usualmente muy doloroso
- Hipersensibilidad inguinal
- Dolor en los ganglios linfáticos de la zona inguinal, usualmente de un solo lado

TRANSMISIÓN

El chancroide se transmite a través de:

- La transmisión sexual se produce durante el contacto de piel con piel con la úlcera abierta
- Puede darse una autoinoculación (infección de otras áreas no relacionadas con el sexo, como el ojo o los dedos) debido al contacto con el pus de la úlcera

COMPLICACIONES/CONSECUENCIAS

Si no se lo trata, el chancroide puede provocar:

- Aumento del riesgo de contraer la infección por VIH
- Los ganglios linfáticos de un lado del cuerpo se agrandan, se tornan duros y dolorosos y se fusionan en un bubón. Puede ser necesario realizar un drenaje quirúrgico para aliviar el dolor.
- Los bubones rotos son sensibles a las infecciones bacterianas secundarias
- En hombres no circuncidados, el nuevo tejido cicatrizal puede hacer que el prepucio no logre retraerse sobre las glándulas.

PREVENCIÓN

- Absténgase de tener contacto sexual
- Inicie tempranamente el tratamiento de toda ETS
- Que ambos miembros de la pareja se sean mutuamente fieles
- Uso de condones de látex para el sexo vaginal, oral y anal. Nota: Los condones protegerán al pene o a la vagina de infectarse, pero no protegerán otras áreas como el escroto o la zona anal.
- Tome toda la medicación prescrita para el chancroide tal como se lo hayan indicado, aun en caso de que los síntomas desaparezcan.

TRATAMIENTO

El tratamiento debería incluir una medicación prescrita por un proveedor de servicios de salud. Dependerá de qué "germen" esté causando la infección. Vea las recomendaciones de tratamiento para la VB, la candidiasis y la tricomoniasis.

- Antibióticos tales como la azitromicina, la ceftriaxona, el ciprofloxacino (no recomendado para mujeres embarazadas o personas menores de 18 años) o la eritromicina base.
- Debería realizarse un examen de seguimiento entre 3 a 7 días después de comenzado el tratamiento.

Nota: Es posible reinfectarse después del tratamiento

Información de contacto:

Para obtener más información acerca de los lugares y servicios médicos de Florida, y de las recomendaciones para el tratamiento, visite nuestro sitio web en http://www.doh.state.fl.us/disease_ctrl/std/clinical/clinical.html

Línea directa nacional sobre VIH, SIDA y ETS
1-800-342-2437 ó 1-800-227-8922

Español
1-800-227-8922

Sordos o personas con discapacidad auditiva
1-800-243-7889